



Estas instrucciones están pensadas para que el procedimiento se desarrolle de la mejor forma posible. Lea íntegramente esta ficha de preparación al menos 5 días antes de la intervención y siga atentamente las instrucciones. Si no lo hace, su médico puede pasar por alto hallazgos importantes o tener que repetir el procedimiento.



<p>FECHA Y HORA DEL PROCEDIMIENTO:</p> <hr/> <p>La hora A LA QUE DEBE LLEGAR es: _____</p>	<p>PREGUNTAS</p> <p><input type="checkbox"/> McAuley Office 405-749-4247</p> <p><input type="checkbox"/> IBD - McAuley Office 405-752-3900</p> <p><input type="checkbox"/> Edmond Office 405-340-4937</p>	<p>LUGAR DONDE SE REALIZARÁ EL PROCEDIMIENTO</p> <p><input type="checkbox"/> Mercy Hospital Admitting 4300 W. Memorial Rd. OKC, OK 73120</p> <p><input type="checkbox"/> Mercy Outpatient Surgery Center - Edmond I-35 North Building, North Entrance 2017 W. I-35 Frontage Rd. Edmond, OK 73013</p>
--	--	---

RECORDATORIOS IMPORTANTES:

- DEBE venir con una persona mayor de 18 años para que se quede durante el procedimiento y lo lleve a casa. De no hacerlo, el procedimiento no se llevará a cabo.
- Deje de tomar suplementos de hierro y pastillas para adelgazar 5 días antes de la intervención.
- EVITE TODOS LOS FRUTOS SECOS, MAÍZ, PALOMITAS DE MAÍZ, SEMILLAS O CUALQUIER FRUTO QUE TENGA CÁSCARA DURANTE LOS CINCO DÍAS ANTERIORES AL PROCEDIMIENTO.**
- EVITE TOMAR ALEVE, IBUPROFENO Y CUALQUIER OTRO ANTIINFLAMATORIO DURANTE LOS CINCO DÍAS ANTERIORES AL PROCEDIMIENTO. PUEDE TOMAR TYLENOL.**
- Medicamentos:**
 - Tome todos sus medicamentos como de costumbre (incluidos los medicamentos para la tensión arterial) el día anterior y el día del procedimiento, excepto en los siguientes casos:
 - Para diabéticos:
 - Si recibe insulina, el día del procedimiento tome sólo la mitad de la dosis de la mañana.
 - La mañana del procedimiento, no tome pastillas para la diabetes.
 - SI ESTÁ TOMANDO ANTICOAGULANTES COMO PLAVIX, WARFARINA, ELIQUIS, XARELTO, ETC., PÓNGASE EN CONTACTO CON NUESTRO CONSULTORIO PARA QUE LE INDIQUEMOS CUÁNTO TIEMPO ANTES DEL PROCEDIMIENTO DEBE DEJAR DE TOMARLOS. NO ES NECESARIO QUE DEJE DE TOMAR ASPIRINA EN DOSIS BAJAS (325 MG O MENOS).**

<p>El día anterior al procedimiento: _____</p>	<p>El día del procedimiento: _____</p>
<p>No coma NINGÚN alimento después de medianoche.</p> <p>Puede beber agua hasta la hora de NO INGERIR NADA POR BOCA que se indica a continuación.</p>	<p>NO INGIERA NADA POR BOCA - DEBE HACER AYUNO TOTAL a partir de las CUATRO HORAS ANTES DE LA HORA DEL PROCEDIMIENTO.</p> <p>** AYUNO TOTAL significa ABSOLUTAMENTE NADA POR BOCA - incluidos goma de mascar, dulces, tabaco, agua, etc.**</p>